




به نام خدا

آموزش مراقبت از فرزندان پس

از عمل کاشت حلزون



آموزش به بیمار بیمارستان لقمان حکیم

ویرایش: آذر ۹۸

۲- سفالکسین هر ۶ ساعت پس از ترخیص داده شود. (طبق دستور پزشک) به خاطر داشته باشید که شربت معمولاً تا ۱۴ روز در یخچال قابل نگهداری است (به بروشور دارویی نیز توجه شود).

دوره آنتی بیوتیک را به طور کامل رعایت کنید.

دوزهای دارو بایستی با فواصل زمانی مساوی و دقیق مصرف شوند.

در صورت حساسیت به پنی سیلین و تاریخچه آلرژی پزشک را مطلع فرمائید.

منابع:

برونر و سودارث، داخلی جراحی پرستاری، چشم و گوش، ۲۰۱۸، ترجمه زهرا مشتاقی

۱۰- ممکن است بعد از جراحی فرزندان تورم لب داشته باشد که در صورت شروع مایعات باید از نی استفاده کنید.

۱۱- باید برای فرزندان از لباس های دکمه دار یا زیپ دار استفاده کنید تا پانسمان دستکاری نشود.

۱۲- از شستن موهای فرزندان تا کشیدن بخیه ها بعد از عمل احتنا بکنید.

آموزش دارویی:

۱- از دادن استامینوفن مداوم

خودداری گردد زیرا تب و عفونت را مخفی می کند.

۱- بعد از عمل ممکن است فرزندتان بی قراری کند و شما باید او را آرام کنید.

۲- اطراف محل عمل تورم و درد زیادی خواهد داشت.

۳- از ضربه به سر اجتناب شود

۴- از تماس فرزندتان با افرادی که سرماخوردگی دارند جلوگیری کنید.

۵- باید از حرکت ناگهانی و سریع کودک بخصوص در ۲۴-۳۶ ساعت اول جلوگیری کنید.

۶- چند روز اول ممکن است کودک عدم تعادل داشته باشد که نیاز به مراقبت دارد.

۷- ممکن است دست و پای

فرزندتان را جهت جلوگیری از

دستکاری پانسمان و یا در آوردن

آنژیوکت محدود کنند.(ببندند)

۸- ممکن است فرزندتان به دنبال

بیهوشی گیج باشد و یا تهوع و

استفراغ داشته باشد.

۹- ممکن است فرزندتان چرت بزند

و با وحشت و گریه بیدار شود.

