


سقط



تهیه و تنظیم: اکرم السادات صدرایی

نکته: شایعترین علامت و نشانه سقط خونریزی واژینال است.

در صورت وجود هر گونه خونریزی و واژینال ولکه بینی و درد در دوران بارداری فوراً به پزشک معالج مراجعه کند.

در صورت وجود لکه بینی بدون درد با پزشک معالج مشاوره کند.

دارو را طبق دستور دکتر معالج در ساعت مقرر استفاده نماید.

میزان و مدت استراحت و نحوه آن با توجه به شرایط بیمار و دستور دکتر معالج می باشد.

۵

سقط فراموش شده: جنین مرده و برای مدتی حتی ماهها در رحم باقی مانده و هنوز دفع نشده است.

سقط کامل که بدنبال خونریزی قبلی که رخ داده محتویات رحم بطور کامل خارج شده است.

سقط ناقص: دهانه رحم کاملاً باز بوده و خونریزی زیاد و درد های انقباضی در زیر شکم وجود دارد در این حالت مقداری از محصولات دفع شده و مقدار زیادی از این محصولات در رحم باقی است.

سقط مکرر یا عادت: بیشتر از سه جنین پشت سر هم راکه احتمالاً اثر علل متعدد رخ داده است.

۴

سقط جنین:

حاملگی موفق: به بارداری اطلاق میشود که طی آن جنین رشد و تکامل خود را پیدا کرده و در ضمن حفظ سلامت مادر منجر به تولد نوزادی سالم شود.

سقط جنین شایعترین عارضه حاملگی در سه ماهه اول حاملگی می باشد که موجب استرس روحی شدید در زوجهای مشتاق فرزند میشود.

سقط جنین یعنی به مقصد نرسیدن حاملگی و در واقع یکی از فوریتهای زنان و مامایی می باشد.

عوارض جدی سقط جنین: شامل خونریزی عفونت، شوک با کتر یال می باشند.

عوامل ایجاد کننده سقط جنین در زنان به دو دسته عمده تقسیم می شود:

۱. عوامل جنین شامل:

الف- نمو غیر طبیعی تخم که در ۴۰٪ موالد اختلال رشد منجر به سقط جنین خود بخود

علل سقط ۱- ناهنجاریهای ارثی و ژنتیکی جنین

۲. عوامل مربوط به مادر:

الف- بیماریهای عفونی مادر: سرخچه - تب مالت و عفونتهای مقاربتی

ب- بیماریهای مزمن ناتوان کننده در مادر: سل- سرطان- افزایش فشارخون و بیماریهای کلیه

ج- بیماریهای غدد: کم کاری تیروئید- دیابت

د- مصرف دارو

ذ- عوامل محیطی: سیگار- الکل- داروهای ضد بارداری- سرب- آرسنیک

ر- ناهنجاریهای رحمی- فیبروم

ز- نارسایی دهانه رحم: بازبودن بیش از حد دهانه رحم

نکته: سقط جنین در زنان باردار زیر ۲۰ سال و بالای ۴۰ سال بیشتر است.

انواع سقط جنین:

زمانیکه سقط خود بخود بدون استفاده از راههای دارویی یا

مکانیکی تخلیه رحم صورت

می گیرد به آن سقط خود بخودی اطلاق می شود که به موارد زیر تقسیم بندی میشود:

سقط فراموش شده- سقط کامل-

سقط ناقص- سقط غیر قابل اجتناب