




به نام خدا

آموزش به بیمار قبل و بعد از آنژیوگرافی



تهیه و تنظیم: سمیرا رضائی


ویرایش: مهر ۱۴۰۳

(۱)

-علائم انسداد شریانی ، ایجاد لخته مثل
درجه حرارت، رنگ اندام، وجود درد،
حس گزگز شدن و کرختی بررسی و درد.
-بیمار به مدت ۲۴ ساعت در تخت
مانده و پایش را در حالت صاف نگه
دارد.

منابع

سودارث، قلب و عروق، ویراست
پانزدهم ۲۰۲۲
ترجمه : دکتر سید مسلم مهدوی



(۶)

مراقبت بعد از آنژیوگرافی

-برای پیشگیری از خونریزی فشار با
دست بر روی ناحیه جراحی شده
انجام شود و سپس پانسمان فشاری انجام می شود و
یک کیسه شن به مدت ۴-۶ ساعت در محل گذاشته
می شود.


-بیمار به مدت ۲-۴ ساعت بعد از آنژیوگرافی
ناشتا باشد.

-بیمار بعد از آنژیوگرافی از نظر خونریزی
کنترل شود.



(۵)

- هنگام تزریق ماده حاجب ممکن است بیمار احساس گرما و نیاز به دفع ادرار داشته باشد.



- در حین آنژیوگرافی بیمار هوشیار است و بعد از انجام این تست کاتتر خارج می شود.

- توصیه می شود بعد از تزریق ماده حاجب سرفه کند چون باعث قطع آریتمی قلبی و کمک به عبور ماده حاجب از شریان ها می شود همچنین تنفس عمیق باعث پایین آمدن دیافراگم و بهتر دیده شدن ساختمان قلب می شود.

(۴)

مراقبت های قبل از آنژیوگرافی

- بیمار ۸-۱۲ ساعت قبل از تست ناشتا باشد.

- دارو های ضد انعقاد مثل هپارین و

وارفارین از ۲۴-۴۸ ساعت قبل از آنژیوگرافی قطع شود.

- محل کشاله ران و زیر بغل شویو شود.

- در صورت لزوم آرام بخش تجویز می شود.

- ممکن است در حین آنژیوگرافی در اثر برخورد نوككتر به دیواره قلب، احساس درد و تپش قلب ایجاد می شود.

(۳)



آنژیوگرافی چیست؟

آنژیوگرافی عملی است که در آن با استفاده از اشعه ایکس، عکس هایی را از رگ های قلب می گیرند و برای این کار، رنگ مخصوصی را از طریق یک لوله ی بسیار نازک از کشاله ران و یا دست به رگ های خونی قلب وارد می کنند.



آنژیوپلاستی چیست؟

روشی برای باز کردن عروق تنگ و یا بسته ی قلب است، آنژیوپلاستی تحت بی حسی موضعی و بدون درد انجام میشود. حداکثر ۲۴ ساعت بعد از انجام آنژیوپلاستی، بیمار میتواند از بیمارستان مرخص شود و به زندگی معمول خویش برگردد.

(۲)