



به نام خدا

آنوریسم مغزی



تهیه و تنظیم: سمیرا رضائی

ویرایش: مهر ۱۴۰۳

عوارض جانبی :

۱. تهوع گذرا ۲- استفراغ ۳- سوء هضم ۴- گرفتگی شکمی ۵. اسهال یا یبوست ۶- ممکن است در افرادی که دارو را به صورت مکمل درمان مصرف می کنند موجب افزایش آرام بخشی و خواب آلودگی شود ۷ -افزایش اشتها و وزن ۸ -ریزش موقت مو ۹ -ادم و ورم ۱۰ -کاهش پلاکت ۱۱ -نامنظم شدن قاعدگی

مراقبت پرستاری:

بعد از مصرف بلند مدت دارو به طور ناگهانی دارو را قطع نکنید، ممکن است موجب تشنج شود عملکرد کبدی و شمارش CBC و پلاکت بیمار را چک کنید پوست بیمار را از نظر خونمردگی چک کنید خواب آلودگی معمولاً با ادامه درمان از بین می رود از انجام کارهایی که مستلزم هوشیاری یا مهارت های حرکتی است تا زمان ثبات پاسخ به دارو پرهیز شود از نوشیدن الکل پرهیز شود.

در صورت بروز خونمردگی یا خون ریزی فوراً مراجعه کند. قبل از هر نوع جراحی یا رویه تهاجمی (مثل دندان پزشکی) درمانگر را از مصرف دارو مطلع سازد. مراقبت پرستاری آنوریسم حین دفع ادرار و مدفوع جهت کاهش فشار خستگی از دهان نفس بکشد. از ملین های سبک استفاده شود و به هیچ وجه تنقیه نشود. نور اتاق کم باشد. چای و قهوه به استثنای انواع کافئینه آن از رژیم غذایی روزانه حذف شود. استفاده از جوراب های الاستیک مخصوص پاها از نظر وجود ترومبوز ورید های عمقی (حساسیت، ورم، گرمی و قرمزی، ادم) محرک های خارجی در پایین ترین سطح ممکن نگاه داشته شود (دیدن تلویزیون، شنیدن رادیو، مطالعه)

منابع:

برونر و سودارث، ویرایش پانزدهم (۲۰۲۲) ترجمه زهرا مشتاق راهنمای آموزش مددجو برای مراقبت در منزل، فاطمه علایی و همکاران

آنوريسم:

اين بيماري عبارت است از اتساع ديواره ي شريان مغزي به دليل ضعف ماهيچه هاي شرياني. اين اختلال ممكن است به دنبال آترواسكلروز شرياني و تغيير در ساختمان ديواره ي شريان مغزي و به دنبال آن كيسه اي شكل شدن آن ايجاد شود. همچنين فشار خون بالا، تروماي سر، افزايش سن و اختلالات مادر زادي مي توانند عامل بروز آن باشند. علائم پارگي آنوريسم: سردرد ناگهاني شديد، کاهش سطح هوشياري براي يك دوره زماني متغير به دليل تحريك مننژ اختلالات بينايي به صورت كوري، دوبيني و افتادگي پلك و در صورت فشار آنوريسم به عصب حركتي - بينايي ديده مي شود. سفتي پشت گردن و مهره ها به دليل تحريك مننژ، وزوز گوش، سرگيجه و همي پارزي (بي حسي يك طرف بدن)

بررسي بيمار در بخش اورژانس

پارگي و خونريزي آنوريسم عارضه اي است كه از ۲۴ ساعت بعد از خونريزي اوليه تا ۷ الی ۱۰ روز بعد مي تواند اتفاق بيافتد.

علائمي كه نشانگر پارگي آنوريسم هستند عبارتند از: سردرد ناگهاني و شديد، تهوع و استفراغ، کاهش سطح هوشياري و اختلالات پيش رونده عصبي هستند.

درجه بندي آنوريسم هاي مغزي

درجه ۱: مشكل بيمار حداقل بوده، سردرد هاي خفيف دارد
درجه ۲: مشكل بيمار خفيف بوده، هوشياري است، سردرد هاي شديد و سفتي گردن مشاهده مي گردد.
درجه ۳: مشكل بيمار متوسط است، حس گيجي دارد، اختلال خفيف و موضعي عصبي نظير همي پارزي در فرد ديده مي شود، سردرد شديد و سفتي گردن دارد.
درجه ۴: مشكل بيمار بسيار شديد بوده با حالت استنوپور همراه است اختلالات موضعي شديد عصبي نظير پلثري ديده مي شود.

درمان دارويي آنوريسم

تجويز ملين ها (منيزيم هيدروكسيد و بيزاكوديل) براي جلوگيري از انجام مانور والسالوا (زور زدن) و خونريزي در دو هفته اول. تجويز دارو هاي ضد استفراغ و آرام بخش تجويز آمپول دگزامتازون تجويز آمپول هاي ضد تشنج مثل فني تونين بعلت

اينكه دارو فشار خون را کاهش مي دهد از تغيير وضعيت ناگهاني پرهيز كنيد.

تجويز نيموديپين جهت جلوگيري از کاهش اسپاسم عروق مغزي.

نيموديپين: در صورتي كه داروي فشارخون استفاده مي كنيد حتما پزشك معالج را مطلع بفرمائيد. در صورت درد قلبي حتما پزشك را مطلع بفرمائيد.

فني تونين

عوارض: خواب آلودگي، تاري ديد، درد مفاصل با ادامه درمان خواب آلودگي کاهش مي يابد. مراقبت پرستاري: در صورت وقوع ناراحتي گوارشي، دارو به همراه غذا مصرف شود. براي جلوگيري از خونريزي و تورم لته ها بهداشت دهان و دندان را به خوبي رعايت كنند، لته هارا ماساژ داده و در صورت وقوع تب، زخم گلو، تورم غده اي و واكنش پوستي گزارش دهيد با ادامه درمان معمولا خواب آلودگي کاهش يافته يا ناپديد مي شود از قطع ناگهاني دارو خودداري شود والپروات سدیم