

به نام خدا ایکتر نوزادی




تهیه و تنظیم: سمیرا رضائی

ویرایش مهر ۱۴۰۳

(۱)

۹۰ ثانیه به طور منظم جهت در معرض قرار دادن پوست تمام قسمتهای بدن حداقل هر ۲ ساعت در برابر نور قرار دهید. چشم‌ها را از نظر ترشح و تحریک به طور مستمر کنترل کنید. از مالیدن روغن‌ها و لوسیون برروی پوست اجتناب کنید.
مادر از یک برنامه غذایی مناسب و توأم با مصرف حداقل ۸ لیوان مایعات در طول روز برخودار باشد. تغذیه با شیر مادر روند بهبود کودک را تسریع می‌کند.



(۶)

۴. بدماهی بدن نوزاد بالای ۷/۳۷ نباشد.

۵. رژیم مادر شیرده مناسب باشد و از مصرف شیرینی، چربی و غذاهای پرادویه پرهیز کند.

عارض زردی نوزادی:

*کرون ایکتروس و صدمه به ساقه مغز در مواردی که بیلی روین بالای ۲۰ باشد.

*ناشنوایی

*فلج مغزی



*تعویض خون برای درمان ایکتر نوزادی (برای تعویض خون نیاز به رضایت والدین می‌باشد).

*برداشتن ۲۰ میلی لیتر از خون نوزاد طی ۲۰ ثانیه و ترانسفوزیون همان حجم خون در عرض بیش از

(۵)

۵. نوزاد حتماً تغذیه هر ۲ ساعت را داشته باشد.

۶. ثبت زمان شروع و وقفه فتوترایپی.

خود مراقبتی مرتبط با ایکتر نوزادی:

۱. تغذیه نوزاد کافی باشد و شیردهی خوبی داشته باشد که به کارکرد کبد کمک می‌کند و بدن دچار کم آبی نمی‌شود.

۲. کنترل میزان ادرار که اگر خوب باشد یعنی شیردهی نوزاد کافی بوده است.
۳. رنگ ادار نباید تیره و مدفوع بی‌رنگ باشد.



(۴)

مراقبت پرستاری زردي نوزادي:

۱. فتوترایپی: استفاده از اشعه ماوراء بنفس نور آبی



(۳)



زردي نوزادي يا هايپربيلى روبينمى نوزادي به حالتى گفته مى شود که ميزان بيلى روبين ۲۴ ساعت اول تولد بالاي ۵ ميلى گرم در دسي ليتر باشد و در روزهای بعد نيز بالاتر از حد نرمال باشد.

چه افراي در معرض خطر هستند؟

ناسازگاري بين خون مادر و نوزاد. برخى شرایط ارثى كمبود آنزيم G6PD نارسايى ها عفونتى که در جنينى شروع و در نوزادي ادامه يابد. بيماران دچار اختلال تيروئيد و...

(۲)