

خونریزی غیر طبیعی

رحمی خونریزی غیرعادی رحمی به معنای هر گونه خونریزی شدید یا غیرمعمول از رحم (از طریق مهبل) است. این نوع خونریزی می‌تواند هر زمان در طول عادت ماهانه اتفاق بیفتد. همچنین خونریزی پیش‌بینی نشده در افرادی که در دوران یائسگی به سر می‌برند و تحت هورمون درمانی هستند

علائم خونریزی غیرعادی

خونریزی مهبلی بین دوره‌های قاعده‌گی یکی از علایم خونریزی غیر طبیعی رحم است. خونریزی شدید در طول دوره قاعده‌گی همچنین می‌تواند به عنوان خونریزی غیرعادی رحمی در نظر گرفته شود. برای مثال خونریزی ممکن است آنقدر زیاد باشد که هر ساعت فرد را مجبور به تعویض یک یا بیش از یک تامپون یا نوار بهداشتی کند.

زنان جوانی که در دهه ۲۰ و ۳۰ زندگی خود هستند: یکی از عوامل رایج خونریزی در زنان

حاملگی است. بسیاری از زنان در چند ماه اول یک حاملگی نرمال دچار خونریزی می‌شوند. برخی از فرcess‌های ضدبارداری یا ابزار درون رحمی (IUD) همچنین می‌تواند باعث خونریزی غیر طبیعی شود.

زنانی که در دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ زندگی خود هستند: در سال‌های منتهی به یائسگی و در زمان آغاز یائسگی، زنان ماههای بدون تخمک‌گذاری را تجربه می‌کنند. چنین چیزی می‌تواند باعث خونریزی غیرعادی رحمی از جمله قاعده‌گی‌هایی با خونریزی سنگین، و سبک بصورت غیرمنتظم شود.

علل: دلایل زیادی برای ایجاد خونریزی غیرعادی رحمی وجود دارد. حاملگی یکی از دلایل رایج است. همچنین پلیپ‌ها یا تومورهای فیبروئیدی (ضایعات کوچک و بزرگ) در رحم می‌توانند عامل خونریزی باشند. در موارد نادر، مشکل تیروئید، عفونت دهانه رحم یا سرطان رحم می‌تواند باعث خونریزی رحمی شود

در بیشتر زنان، خونریزی غیرعادی رحمی به خاطر عدم توازن هورمونی ایجاد می‌شود. زمانی که هورمون‌ها عامل خونریزی هستند، پزشکان آن را خونریزی ناشی از می‌نامند. (DUB) اختلال عملکرد رحم

خونریزی غیرعادی بخاطر عدم توازن هورمون‌ها در زنان با سنین پایین و یا زنانی که به دوران یائسگی نزدیک می‌شوند رایج‌تر است.

در برخی از زنان جوان مبتلا به خونریزی غیرعادی رحمی، در طول دوره قاعده‌گی تخمکی از تخدمان‌ها آزاد نمی‌شود چنین چیزی در دخترانی که تازه به سن قاعده‌گی رسیده‌اند رایج است. این مستلزم باعث عدم توازن هورمونی می‌شود که در آن استروژن بدن باعث رشد زیاد پوشش با غشاء داخلی رحم و افزایش ضخامت بیش از حد آن می‌شود. زمانی که در طول دوره قاعده‌گی، بدن این پوشش ضخیم را دفع می‌کند، خونریزی بسیار شدیدخواهد بود.

ضخیم شدن پوشش داخلی رحم یکی دیگر از عوامل خونریزی در زنانی است که در دهه ۴۰ و ۵۰ زندگی خود قرار دارند. ضخامت پوشش داخل رحم می‌تواند هشداری برای سرطان رحم باشد. شاید این شرایط بخشی از فرآیند افزایش سن است، با این وجود باید مطمئن شوید که سرطان رحم عامل آن نیست

تشخیص: اگر امکان حاملگی وجود داشته باشد، ۱- تست حاملگی

۲- آزمایش سونوگرافی از ناحیه لگن



به نام خدا

خونریزی های غیرطبیعی رحمی



drdarvishzadeh.com

ویرایش:سمیرا رضایی مهر ۱۴۰۳

تهیه و تنظیم:فاطمه اسماعیلی

از انواع قرص های ضدبارداری بخصوص قرص هایی که تنها حاوی پروژسترون هستند می توانند در برخی زنان خونریزی غیرعادی ایجاد کنند.

دیلاتاسیون و کورتاژ: روشی است که در آن پزشک از ابزار برای تراشیدن پوشش داخلی رحم استفاده می کند. سپس در آزمایشگاه بررسی می شود.

۳- نمونه برداری یا کورتاژ تشخیصی

۴- تست پاپ اسمیر برای تشخیص وجود یا عدم وجود عفونت ۵- آزمایش تیروئید

پیشگیری: اگر خونریزی غیرعادی رحمی به علت تغییرات رحمی ایجاد شده، امکان پیشگیری وجود ندارد. اما اگر تغییرات هورمونی بخاطر افزایش وزن ایجاد شده، کاهش وزن می تواند به پیشگیری کمک کند. وزن شما بر تولید هورمون ها تاثیر می گذارد.

درمان خونریزی :

درمان شما به عامل خونریزی، سن، و تصمیم شما برای حاملگی در آینده بستگی دارد. پزشک برای انتخاب درمان مناسب به شما کمک خواهد کرد. برای مثال اگر پزشک به این نتیجه برسد که عدم توازن هورمونی عامل خونریزی است، ممکن است صبر کند تا خونریزی خود به خود خوب شود. برخی از گزینه های درمانی شامل موارد زیراست:

قرص های ضدبارداری: این قرص ها حاوی هورمون هایی است که قادر هستند مانع ضخامت بیش از حد پوشش درونی رحم شوند. این قرص ها همچنین دوره قاعدگی را تنظیم می کنند و گرفتگی را کاهش می دهند. برخی