




به نام خدا

سقط جنین



ویرایش: سمیرا رضایی

مهر ۱۴۰۳

نکته:

شایعترین علامت و نشانه سقط خونریزی واژینال است. در صورت وجود هرگونه خونریزی واژینال ولکه بینی و درد دردوران بارداری فوراً به پزشک معالج مراجعه کند. در صورت وجود لکه بینی بدون درد با پزشک معالج مشاوه کند.

دارو را طبق دستور دکتر معالج در ساعت مقرر استفاده نماید. میزان ومدت استراحت ونحوه آن با توجه به شرایط بیمار ودستور دکتر معالج می باشد.

سقط فراموش شده:

جنین مرده و برای مدتی حتی ماهها در رحم باقی مانده و هنوز دفع نشده است.

سقط کامل: به دنبال خونریزی قبلی که رخ داده محتویات رحم بطور کامل خارج شده است.

سقط ناقص: دهانه رحم کاملاً باز بوده و خونریزی زیاد و درد های انقباضی در زیر شکم وجود دارد در این حالت مقداری از محصولات دفع شده و مقدار زیادی از این محصولات در رحم باقی است.

سقط مکرر یا عادی: بیشتر از سه جنین پشت سر هم راکه احتمالاً در اثر علل متعدد رخ داده است.

سقط جنین :

حاملگی موفق: به بارداری اطلاق میشود که طی آن جنین رشد و تکامل خود را پیدا کرده و در ضمن حفظ سلامت مادر منجر به تولد نوزادی سالم شود .

سقط جنین شایعترین عارضه حاملگی در سه ماهه اول حاملگی می باشد که موجب استرس روحی شدید در زوجهای مشتاق فرزند میشود . سقط جنین یعنی به مقصد نرسیدن حاملگی و در واقع یکی از فوریتهای زنان و مامایی میباشد.

عوارض جدی سقط جنین:

شامل خونریزی، عفونت، شوک باکتریال می باشند .

عوامل ایجاد کننده سقط جنین در زنان

به دو دسته عمده تقسیم می شود:

۱-عوامل جنین شامل:

الف-نمو غیر طبیعی تخم که در ۰.۴٪ مولد اختلال رشد و منجر به سقط جنین خود بخود

ب -ناهنجاریهای ارثی و ژنتیکی جنین

۲-عوامل مربوط به مادر:

الف- بیماریهای عفونی مادر: سرخجه -تب مالت و عفونتهای مقاربتی

ب-بیمایهای مزمن ناتوان کننده در مادر: سل-سرطان-افزایش فشارخون و بیماریهای کلیه

ج-بیماریهای غدد: کم کاری تیروئید-دیابت

د-مصرف دارو

ذ- عوامل محیطی: سیگار-الکل- داروهای ضد بارداری -سرب -آرسنیک -ناهنجاریهای رحمی-فیبروم

ز-نارسایی دهانه رحم: بازبودن بیش از حد دهانه رحم

نکته:سقط جنین در زنان باردار زیر ۲۴ سال و بالای ۴۰ سال بیشتر است .

انواع سقط جنین :

زمانیکه سقط خود بخود بدون استفاده از راههای دارویی یا مکا نیکی تخلیه رحم صورت می گیرد به آن سقط خود بخودی اطلاق می شود که به موارد زیر تقسیم بندی میشود :

سقط فراموش شده-سقط کامل -سقط ناقص-سقط غیر قابل اجتناب