

(۶)



## مرکز پژوهشی آموزشی و درمانی‌گامان حکیم

### سمومیت با مواد مخدر در کودکان



تهیه و تنظیم:

آموزش به بیمار بیمارستان لقمان حکیم

ویرایش: مهر ۱۴۰۳

(۵)

- ❖ در این شرایط کودکان در برابر حوادث و مسمومیت اتفاقی آسیب پذیرترند.
- ❖ از قرار دادن دارو در کیف دستی پرهیز کنید تا مانع خورده شدن دارو توسط کودکان شود.
- ❖ داروهایی مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس کودکان نگهارید.
- ❖ اگر به کودک خود دارو می‌دهید به او تفهیم کنید که این دارو است و از کلماتی مثل آبنبات، شکلات و یا خوراکی استفاده نکنید.



منابع : برونز و سودارت داخی-جراحی، اطفال  
ویراست ۲۰۲۲

Farnaghi F, Jafari N, Mehregan FF.  
Methadone Poisoning among Children  
Referred to Loghman-Hakim Hospital in 2009.  
Pejouhandeh 2012;16(6):299-303.

❖ به کودکان بیاموزید هیچ چیزی ننوشند و یا نخورند مگر اینکه با اجازه بزرگسالان باشد

❖ داروهای خود را در مقابل چشم کودکان نخورید، چرا که کودکان از رفتار بزرگسالان تقليد می‌کنند و ممکن است دور از چشم والدین داروها را به دهان ببرند

❖ در صورتیکه کودک شما مواد مخدر و مشتقات آن و یا هر نوع ماده غیرخوراکی دیگر را بلعید، هر چه سریع تر او را نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل نمایید و یا با مرکز اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید

❖ داروها، مخدراها و مواد شیمیایی و شوینده، نفت و بنزین و ... را همیشه در ظرف اصلی آن نگهداری کنید. و هیچگاه این فرآورده‌ها را در ظرف مواد خوراکی (مانند بطری نوشابه یا آب معدنی) نگه داری نکنید. این عمل سبب خورده شدن اتفاقی این مواد توسط کودک می‌شود.

❖ زمانیکه شما در منزل نیستید و کودک را به فرد دیگری می‌سپارید، کودکان در معرض بیشترین خطر مسمومیت قرار دارند

❖ در هنگام بروز مسائل و مشکلات خانوادگی، بیشتر مراقب کودکان باشید.

کودک به سرعت به بیمارستان منتقل شود. شروع اثر متادون ۱۵ دقیقه و مدت

(۱)

## سمومیت با مواد مخدر در کودکان

(۲)

اثر آن طولانی و بیش از ۲ روز است. علائم مسمومیت معمولاً در عرض ۲۰-۳۰ دقیقه بعد از خوردن آن ظاهر می‌شود. در مسمومیت با متادون تا ۳ روز، درمان با نالوکسان و بستره بودن در بیمارستان ضروري است. پادزه ر مسمومیت با مواد مخدر، دارویی به نام نالوکسان است که با تجویز آن تمامی علائم بیمار برطرف می‌گردد. تجویز این دارو باید توسط پرستنی درمانی و در بیمارستان انجام شود. مدت اثر نالوکسان ۲۰-۹۰ دقیقه است.

### نکته‌ی مهم

گر بیماری با قطع تنفس به اورژانس مراجعه کند و بدنبال تجویز نالوکسان بهتر شود اما به هر دلیل بیمار را از بیمارستان ترخيص شود و درمان نالوکسان برای وي ادامه نیابد. کودک حدود یک ساعت بعد دوباره دچار قطع تنفس و مرگ خواهد شد.



علائم

به دنبال مسمومیت با متادون کودک دچار استقراغ، بی‌حالی، خواب‌آلودگی می‌شود و در صورت عدم درمان دچار قطع تنفس و مرگ می‌شود. برای جلوگیری از بروز علایم خطرناک و مرگ‌افرین باید

(۳)

## آموزش مراقبت از کودک توسط والدین

- ❖ کودکان زیر ۵ سال، پر خطرترین گروه سنی از نظر بروز مسمومیت هستند.
- ❖ در دسترس بودن و مصرف داروهای ترک اعتیاد مانند شربت متادون، می‌تواند منجر به مرگ کودکان شود. و اگر کودکی پس از مصرف ناجایی این مواد علامت و نشانه‌ای نداشت، دلیل بر رفع خطر نمی‌باشد.
- ❖ کودکان خردسال ممکن است هر چیزی را به دهان ببرند. و این عمل زمینه ساز بروز مسمومیت است.
- ❖ کلیه داروهای از جمله ترکیبات مخدر و متادون و مواد شیمیایی را در منزل در کمدهای دارایی قفل و دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید. و درب کمد را با قفل یا طناب محکم نمائید.
- ❖ همیشه پس از استفاده از هر نوع دارویی سریعاً درب آن را ببندید، و بدانید هیچ ظرف دربسته‌ای از دسترسی کودکان در امان نیست.
- ❖ در هنگام استفاده از داروهای مواد شیمیایی و پاک کننده اگر مجبور شدید به زنگ درب ورودی و یا تلفن جواب دهید، هرگز از کودک خود چشم برندارید.

سمومیت با مواد مخدر و مشتقات آن از مسمومیت های خطرناک، کشنده و متابفانه شایع در کودکان، نوزادان و شیرخواران کشورمان است. افزایش چشمگیر مسمومیت با متادون از مهم ترین علل مرگ و میر ناشی از مسمومیت‌ها در اطفال می‌باشد. کودکی که دائم در معرض مواد مخدر، دود تریاک و یا متادون است بهره‌ی هوشی کمتری نسبت به بقیه بچه‌ها دارد. متادون مخدري با اثرات ضد دردي بسیار قوي که مصرف آن طی سالهای اخیر برای تسکین درد و ترک اعتیاد به صورت شربت و قرص رایج شده است. در هر سی سی شربت متادون ۵ میلی گرم متادون وجود دارد که حتی کمتر از یک سی سی از آن در طفل می‌تواند مسمومیت خطرناک و قطع تنفس و حتی مرگ بدده. شربت متادون طعم تلخ و ظاهري شبیه آب دارد که به علت نگهداري غير ایمن این ماده مخصوصاً در شیشه نوشابه و آب معدنی و شیشه دارو که باعث مصرف اشتباهی آن و مسمومیت جدی می‌شود.

علائم

❖ تصمیم در مورد بی خطر یا خطرناک بودن  
یک مسمومیت در کودک را به عهده پزشک  
بگذارید.

(۴)