

این پشه ها معمولا در ساعات اولیه روز نیش میزنند اگر پشه ماده انسان مبتلا به تب دانگی را نیش بزند ویروس دانگی به پشه منتقل می شود ده روز بعد ویروس به غده بزاقی پشه نفوذ می کند.



کیت این بیماری ویروسی است که توسط گزش پشه آئدس به انسان منتقل میشود. به دو شکل معمولی (ضعیف) و خونریزی دهنده (شدید) بروز میکند. نشانه های تب دانگی ۳ تا ۱۴ روز بعد از ویروس به بدن ظاهر میشوند. تهوع ، استفراغ ، درد مفاصل ، تب بالا، سردرد ، درد چشم، خونریزی دماغ ولته

خطر این پشه جدی است

پشه آئدس ناقل بیماری های کشنده ای است که درمان قطعی ندارد. براساس گزارشات نظام مراقبت سندرمیک جاری در کشور از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۳



مرکز پزشکی آموزشی و
درمانی لقمان حکیم

تب دانگی

طراح: سمیرا رضایی مهر ۱۴۰۳

۵. قرار دادن پوشش هایی برای ظروف ذخیره آب
۶. تخلیه، شستن مرتب سطل زباله خانگی
۷. پوشاندن پنجره ها با توری های ریز
۸. استفاده از لباس آستین بلند و شلوار



راه های مقابله با آن

۱. تمیز کردن آب زیر گلدان و ظرف آب حیوانات
۲. خالی کردن آب های راکد کولر ، ناودان و...
۳. خودداری از نگهداری تایر در فضای غیرمسقف
۴. جمع آوری ظروف رها شده غذا و نوشیدنی

تیرماه تا کنون بالغ بر ۱۲۲ مورد مثبت تب دنگی تشخیص داده شده است. لازم به ذکر است در حال حاضر واکسن مذکور در ایران موجود نمیباشد .

درمان

برای درمان بیماری، استراحت کردن و نوشیدن مایعات کافی بسیار حائز اهمیت است. از مصرف خود سرانه مسکن ها خودداری شود زیرا ممکن است باعث تشدید مشکلات خونریزی شود.