

## لوله گذاری معده

### نکات مهم

➤ هر روز یکبار لازم است چسب روی بینی تعویض شود و بینی از نظر تحریک پوستی مورد بررسی قرار گیرد .

➤ برای دادن غذا یا دارو ، بیمار باید در وضعیت نیمه نشسته ( زاویه 30 تا 45 درجه ) قرار داده شود تا خطر رفلاکس و آسپیراسیون کاهش یابد و بیمار باید حداقل تا 1 ساعت در این وضعیت باقی بماند .

➤ روش تغذیه بولوس، غذا به مقدار زیاد و در فواصل معین 3-4 بار در روز به کمک نیروی جاذبه وارد معده می شود، بالا آوردن و پایین آوردن سرنگ از سطح شکم ، سرعت جریان محلول غذایی را تنظیم می کند .  
( سرعت پایین ورود مواد غذایی مهم است )

### اطمینان از قرار گیری لوله در جای مناسب

هر بار که که مایع یا دارویی قرار است به بیمار داده شود، باید از محل قرار گیری مناسب لوله مطمئن شد.

1-مشاهده مایع آسپیره شده از نظر رنگ و حجم

مایع خارج شده از معده ، اکثرا کدر و سبز رنگ با حجمی زیاد هستند و مایع خارج شده از ریه معمولا شفاف و کم حجم است .

2- سمع ورود هوا

تزیق کردن هوا به داخل لوله معده و سمع همزمان آن در ناحیه ی اپی گاستر به وسیله گوشی .

بهداشت دهان و بینی

رعایت دقیق و منظم بهداشت دهان و بینی بخش مهمی از مراقبت بیمار را شامل می شود

➤ لوله معده قبل و بعد از هر نوع دارو با 30 میلی لیتر آب شسته می شود .

➤ درجه حرارت محلول غذایی باید در حد گرمای اتاق باشد.

رفرنس : برونر و سودارت پرستاری داخلی -

جراحی گوارش

ویراست چهاردهم 2018

ترجمه : مریم عالیخانی

تهیه کننده: سمیرا رضایی. کارشناسی ارشد

پرستاری

مهر 1403